Rapport d'une observation de Chirurgie envoyé par Mr. Barres

[M]r. Barres Chirurgien Major du Regiment Royal Ecossois — demeurant actuellement a gravelines en flandres, a envoyé a l'academie une observation sur la maniere dont il a Enlevé ~~....~~ une tumeur osseuse située a la partie superieure et interne du tibia, a un pouce de la tuberosité de cet os. La Baze de la tumeur etoit fort Large, et sa figure inegale Etoit Celle d'une truffe de la grosseur d'une pomme d'api. le malade Etoit agé de quinze ans et Lieutenant dans le regiment. la tumeur S'etoit accrue sans douleur et au bout d'un an elle Commenca a gêner les mouvements du genou et le malade ne pouvoit plus mettre de guetres ny de Bottes sans souffrir Considerablement. Mr. Barres avoit reconnu un Vice Scorbutique et se disposant à l'operation malgré l'avis de plusieurs Confreres, il prepara le malade par les remedes propres a Combattre le vice Scorbutique. il lui fit le 28 avril ~~175~~ 1757, en presence de deux Chirurgiens, une incision Longitudinale sur la tumeur L'incision S'etendoit a un pouce au dessus et autant au dessous, il trouva le perioste fort Epaissi et adhérent a une Couche Cartilagineuse de l'Epaisseur d'une Ligne et demie qui Couvroit la tumeur. il Ecarta Lateralement les Bords de la plaie, et a la faveur d'une spatule il dégagea un tendon qui passoit sur la tumeur Comme sur une poulie ensuitte il placa les deux tranchans d'une tenaille incisive assés forte pour la Couper Entierement par sa Base: il y eut une hæmorragie considerable fournie par le Corps de l'os qui etoit spongieux et fort dilaceré. La Charpie et la Charpie furent employés avec succés. Mr. Barres fit tous ses pansements a sec ou avec la teinture de Kin Kina ou le Beaume du perou noir Liquide. Le 4.eme jour de l'operation le malade eut de la fiévre qui dura jusqu'au 14.eme malgré l'usage d'une ptisanne nitrée et des apozêmes febrifuges et temperans que Mr. Barres rendit ensuitte Antiscorbutiques

Ces derniers furent Continués jusqu'a la fin de la Cure et la Cicatrice fut parfaitte sans Exfoliation au bout de soixante et Seize jours.
Cet officier avoit Les gencives Livides, les dents noires et les deux incisives Superieures Carriées; pendant le cours du traittement les deux Branlerent, la Carie disparut et Les gencives se sont affermies et sont restés depuis dans un Etat de santé ordinaire La Cicatrice n'est point Blanche ny adherente au Corps de l'os Comme dans les fractures avec ~~deperdition~~ perte de substance, mais la peau est mince et semblable a la Cicatrice d'une Brulure.

Cette observation presente des faits si Extrahordinaires quil est impossible de les Concilier avec les principes de la bonne Chirurgie. —

on Conçoit aisément que M.r Barrere ayant a traitter une hyperostose Benigne ou Ces tumeurs topheuses placés sur le perioste ou même dans le tissu de cette membranne sans faire Corps avec le reste de l'os soit parvenu a l'Enlever avec des tenailles incisives; mais dans ce Cas il n'y auroit point eu d'hæmorragie ny de dilaceration des parties osseuses et L'operation seroit fort ordinaire; mais qu'une Exostose scorbutique (qui d'alliers sont fort rares) ait Eté enlevée du Corps d'un os dont la texture est viciée, quil se soit fait autravers des Cellules osseuses dilacerées, une issüe de sang assés Considerable pour meriter le nom d'hæmorragie et que la playe se soit Cicatrisée en aussi peu de temps sans Exfoliation sensible En un mot que la Cicatrice soit restée Libre sans adherence a l'os et semblable a une Brulure tous Ces faits me paroissent si Eloignés de la vraisemblance que je ne pense pas que L'academie puisse faire usage de ~~ce Livre~~ travail de M.r Barrere.

Ce 25. 9bre 1772. Mertrud

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE